

## **PROCEDURY DOTYCZĄCE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PLACOWKACH SZKOLNYCH W CZASIE PANDEMII ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KRAJOWEGO KONSULTANTA PEDIATRYCZNEGO**

1. Wyposażenie gabinetów profilaktycznych w środki dezynfekcyjne do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji Rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki z filtrem FFP2 oraz FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy barierowe.

2. W trakcie udzielania świadczeń w gabinecie powinien przebywać tylko 1 uczeń, który dezynfekuje ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.

3. W czasie świadczeń profilaktycznych tj. badań przesiewowych, poradnictwa w problemach zdrowotnych pielęgniarka poza rutynowymi czynnościami higieny rąk powinna zastosować środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbice, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.

4. W przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruciu pielęgniarka powinna zastosować się tak jak w pkt.3 czyli stosować środki ochrony osobistej.

5. W realizowany program edukacji zdrowotnej poza standardowymi teściami powinien zawierać, przede wszystkim zasady minimalizacji transmisji infekcji wirusowej SARS-CoV-2. Pielęgniarka nadzoruje stan środków dezynfekcyjnych dla uczniów oraz nauczycieli, pracowników szkoły.

6. W kontakcie bezpośrednim niż udzielanie świadczeń obowiązuje przestrzeganie dystansu 1,2-2 m. W kontakcie z gronem lub rodzicami uczniów pozostaje kontakt telefoniczny. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje stosowanie maski chirurgicznej.

8.Obowiązuje częste wietrzenie gabinetu, dezynfekcja 2x w ciągu dyżuru.

9.W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie SARS- CoV 2 u ucznia tj. gorączki pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt z PSSE . Sposób postępowania określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka lub dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia.

10.W przypadku pilnej interwencji zadzwonić pod nr 112- dyspozytor podejmie decyzje o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka zaleca uczniowi/ pracownikowi szkoły założenie maseczki. Dyrektor wyznacza pokój – izolatkę, której uczeń będzie izolowany. Pielęgniarka zobowiązana jest wiedzieć o takim miejscu przygotowanym przez nauczyciela.

11.Uczeń/dziecko/ pracownik szkoły nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został izolowany.

12.Pomieszczenie po opuszczeniu dziecka powinno być zdezynfekowane i wywietrzone.

13.Podczas udzielania świadczeń u dziecka/ucznia/ pracownika szkoły, u którego objawy sugerują zakażenie SARS- CoV2 pielęgniarka poza rutynową higieną rąk, powinna zastosować następujące środki ochronne: maski z filtrem FFP2 , FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, rękawice, oraz fartuch barierowy wodoodporny.

14. Nie rekomenduje się u uczniów realizowania profilaktyki fluorkowej w warunkach szkolnych.

materiał zebrał  
z-ca kierownika  
Podmiotu Leczniczego